



بیمارستان نازران با ۲۰۰ تخت شامل:

درمانگاه تخصصی
تصویربرداری
آزمایشگاه
پزشکی هسته ای
پرتودرمانی
اندوسکوپی و کولونوسکوپی

تصویربرداری

سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی اوپن
رادیولوژی اینترونشنال
داخلی ۷۶۰

آزمایشگاه

آزمایشات عمومی
آزمایشات تخصصی مربوط به
سرطان (نمونه گیری داخل منزل
برای بیماران مبتلا به سرطان)
داخلی ۷۱۲

پزشکی هسته ای

اتاق‌های عمل
بستری داخلی و جراحی
هماتولوژی و انکولوژی
اطفال
ICU
اورژانس
شیمی درمانی سرپایی

درمانگاه تخصصی

فوق تخصص هماتولوژی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
متخصص جراحی عمومی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
متخصص زنان و زایمان
متخصص بیهوشی
متخصص قلب
کلینیک دیابت
کلینیک زخم و اوستومی
داخلی ۶۷۰

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

داخلی ۲۷۱

کلینیک پرستاری آموزش سلامت

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود می‌توانید بصورت رایگان
همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ بجز تعطیلات به کلینیک پرستاری آموزش
سلامت مراجعه کنید یا با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.


۰۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰ داخلی ۶۸۲

منبع: www.uptodate.com

عنوان سند: شکستگی گردن ران کد سند: EUPA001/67
تاریخ تدوین: ۱۴۰۱/۷/۱۰ تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره بازنگری: ۰۱
تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۵/۱۲/۱۵

مراقبت پس از عمل جراحی

- بلافاصله بعد از به هوش آمدن یا از بین رفتن بی‌حسی پاها، انقباض عضلات ران و ساق پا را شروع کنید.
- زیر مچ پای عمل شده یک بالش قرار دهید.
- راه رفتن از ۲ روز بعد از جراحی با کمک پرستار و در حضور پزشک شروع می‌شود (بیمار با عصا یا واکر بدون وزن گذاری راه می‌رود).
- از توالف فرنگی استفاده کنید.
- برای پیشگیری از لخته شدن خون حداکثر تا ۳ هفته بعد از جراحی نیاز به تزریق داروی ضد انعقادی طبق دستور پزشک است.
- استحمام ۶ روز بعد از جراحی با نظر پزشک شروع می‌شود.
- تعویض پانسمان ناحیه جراحی یک روز در میان در منزل انجام شود.
- ادامه درمان در منزل با آنتی‌بیوتیک خوراکی و مسکن است.
- در صورت وجود ترشح بد بو روی پانسمان، افزایش درد، تورم قرمزی و تب به پزشک مراجعه نمایید.
- جهت ادامه درمان ۲ هفته بعد از ترخیص به پزشک مراجعه کنید



ویژه بیمار
و همراهی

شکستگی
گردن ران (فمور)



nazeran.hospital

www.noh.ir

۰۵۱-۳۵۰۰۶۰۰۰

مشهد، قاسم آباد، شریعتی ۴۷


شکستگی گردن ران (فemor)

سالمندان به ویژه زنان که به دلیل استئوپروز، پوکی استخوان دارند و افرادی که احتمال زمین خوردنشان بیشتر است در معرض خطر بالای شکستگی گردن ران قرار دارند میزان مرگ و میر یک سال پس از شکستگی گردن ران بین ۱۲ تا ۳۲ درصد می باشد.



علت

پوکی استخوان
ضعف عمومی
عدم تعادل در راه رفتن
ضعف عضلات چهار سر ران
شرایطی که باعث کاهش خون رسانی به مغز می شوند از جمله کم خونی، آمبولی، بیماری قلبی و عروقی



علائم بالینی

پا کوتاه تر شده و به خط وسط بدن نزدیک و به سمت خارج، چرخش پیدا می کند. بیمار از درد ناحیه هیپ و کشاله ران یا سطح داخلی زانو شکایت دارد.

درمان:

• درمان طبی:

کشش پوستی برای کاهش اسپاسم عضلات، ثابت کردن اندام و تسکین درد به کار گرفته می شود.

• درمان جراحی

جا انداختن باز با بسته شکستگی و فیکساسون داخلی تعویض سر مفصل ران با پروتز
جا انداختن بسته همراه با ثابت کردن شکستگی داخل کپسولی از طریق پوست شکستگی های گردن فمور (ران) معمولاً در ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از شکستگی به صورت اورژانسی تحت درمان و جا اندازی از طریق فیکساسیون داخلی قرار می گیرند در صورتی که جریان خون سر فمور، به طور کامل قطع شده باشد امکان ایجاد نکروز عروق سر فمور وجود دارد. بنابراین سر فمور با یک پروتز جایگزین می شود.

