

به چه علت جفت سر راهی اتفاق میافتد؟

بالا بودن سن مادر
سابقه قبلی جفت سرراهی
حاملگی های چند قلو
سابقه سزارین قبلی یا سابقه هر نوع جراحی رحم
مصرف سیگار
خونریزی خارجی

جدا شدن زود هنگام جفت از دیواره رحم

علائم و نشانه جدا شدن زودرس جفت چیست؟
خونریزی تیره همراه با درد شکم و کمر است. در صورت داشتن این علائم باید سریعاً برای نجات جان خود و جنین به اورژانس مراجعه کنید.

عوامل مستعد کننده جدا شدن زودرس جفت شامل فشار خون بالا، بزرگ شدن بیش از اندازه رحم (مانند حاملگی چندقلویی یا جنین درشت)، مشکلات انعقادی در مادر، ضربه به شکم، پاره شدن پیش از موعد کیسه آب، الکل و دخانیات



NORMAL
PLACENTA



MARGINAL



PARTIAL



TOTAL

علل خونریزی نیمه دوم بارداری چیست؟

جدا شدن زودرس جفت، جفت سر راهی، رگ های سر راهی، شروع زایمان، آسیب در دهانه رحم و مجرای تناسلی از علل شایع خونریزی نیمه دوم بارداری است.

علائم و نشانه جفت سر راهی چیست؟

خونریزی روشن بدون درد و انقباض رحمی در زمان استراحت یا فعالیت که بسته به محل قرارگیری جفت میزان خونریزی متفاوت بوده و گاهی اوقات تا انتهای بارداری بدون علامت است.

تعریف جفت سر راهی

اگر جفت در جایی بسیار نزدیک به محل داخلی رحم یا روی آن قرار گرفته باشد به آن جفت سر راهی میگویند.
تشخیص از طریق سونوگرافی می باشد.
مادر در صورت خونریزی بستری و در غیر این صورت نیاز به بستری نیست.

تعریف جدا شدن زودرس جفت :

به جدا شدن جفت قبل از شروع زایمان یا در طی زایمان قبل از خروج جنین گفته می شود .



ویژه بیمار
و همراهی

علل خونریزی
نیمه دوم



📷 nazeran.hospital

🌐 www.noh.ir

☎ ۰۵۱-۳۵۰۰۶۰۰۰

مشهد، قاسم آباد، شریعتی ۴۷

بیمارستان نازران با ۲۰۰ تخت شامل:

درمانگاه تخصصی
تصویربرداری
آزمایشگاه
پزشکی هسته ای
پرتودرمانی
اندوسکوپی و کولونوسکوپی

تصویربرداری

سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی اوپن
رادیولوژی اینترونشنال
داخلی ۷۶۰

آزمایشگاه

آزمایشات عمومی
آزمایشات تخصصی مربوط به
سرطان (نمونه گیری داخل منزل
برای بیماران مبتلا به سرطان)
داخلی ۷۱۲

پزشکی هسته ای

داخلی ۷۸۶

اتاق‌های عمل
بستری داخلی و جراحی
هماتولوژی و انکولوژی
اطفال
ICU
اورژانس
شیمی درمانی سرپایی

درمانگاه تخصصی

فوق تخصص هماتولوژی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
متخصص جراحی عمومی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
متخصص زنان و زایمان
متخصص بیهوشی
متخصص قلب
کلینیک دیابت
کلینیک زخم و اوستومی
داخلی ۶۷۰

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

داخلی ۲۷۱

کلینیک پرستاری آموزش سلامت

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود می‌توانید بصورت رایگان
همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ بجز تعطیلات به کلینیک پرستاری آموزش
سلامت مراجعه کنید یا با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

۰۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰ داخلی ۶۸۲

منبع: www.uptodate.com

کد سند: EUPA001/77

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

شماره بازنگری: ۰

عنوان سند: علل خونریزی نیمه دوم

تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

تاریخ بازنگری: -

تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۵/۱۰/۱۰

علائم خطر

۱- هر گونه خونریزی در دوران بارداری غیر طبیعی
بوده و در صورت مشاهده به اولین مرکز درمانی یا
پزشک مراجعه کنید.

۲- در صورت داشتن درد زیر شکم، خارج شدن بافت
از درون رحم، تب ۳۷/۸ درجه سانتی گراد، ضعف و
سرگیجه حتما به اورژانس مراجعه کنید.

خود مراقبتی

۱- از یک دستمال برای میزان خونریزی استفاده
و نوع خونریزی (رنگ وجود لخته یا روان بودن) را
بیان کنید.

۲- فعالیت بدنی خود را محدود کنید و از بلند
کردن وسایل سنگین خودداری نمائید.