



بیمارستان نازران
انجمن خیریه حمایت
از بیماران سرطانی مشهد



بیمارستان نازران با ۲۰۰ تخت شامل:

درمانگاه تخصصی
تصویربرداری
آزمایشگاه
پزشکی هسته ای
پرتودرمانی
اندوسکوپی و کولونوسکوپی

تصویربرداری

سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی اوپن
رادیولوژی اینترونشنال
داخلی ۷۶۰

آزمایشگاه

آزمایشات عمومی
آزمایشات تخصصی مربوط به
سرطان (نمونه گیری داخل منزل
برای بیماران مبتلا به سرطان)
داخلی ۷۱۲

پزشکی هسته ای

داخلی ۷۸۶

اتاق های عمل
بستری داخلی و جراحی
هماتولوژی و انکولوژی
اطفال
ICU
اورژانس
شیمی درمانی سرپایی

درمانگاه تخصصی


فوق تخصص هماتولوژی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
متخصص جراحی عمومی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
متخصص زنان و زایمان
متخصص بیهوشی
متخصص قلب
کلینیک دیابت
کلینیک زخم و اوستومی
داخلی ۶۷۰

اندوسکوپی و کولونوسکوپی

داخلی ۲۷۱

کلینیک پرستاری آموزش سلامت

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان
همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ بجز تعطیلات به کلینیک پرستاری آموزش
سلامت مراجعه کنید یا با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.
۰۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰ داخلی ۶۸۲



ویژه بیمار
و همراهی

هیستروسکوپی



Instagram: nazeran.hospital

Website: www.noh.ir

Phone: ۰۵۱-۳۵۰۰۶۰۰۰

Address: مشهد، قاسم آباد، شریعتی ۴۷

منبع: www.uptodate.com

کد سند: EUPA001/83

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

شماره بازنگری: ۰

عنوان سند: هیستروسکوپی

تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

تاریخ بازنگری: -

تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۵/۱۰/۱۰

اقدامات مراقبت های پس از هیستروسکوپی


- مراقبت های فردی : تا ۲ هفته پس از عمل اقداماتی مانند استفاده از تامپون واژینال ، رابطه زناشویی ، نشستن در وان ، رفتن به استخر و انجام دوش واژینال خودداری شود.
- آنتی بیوتیک های تجویز شده به طور منظم مصرف شود .

- داروهای هورمونی : برای پیشگیری از چسبندگی داخل رحمی ممکن است تعدادی داروی هورمونی برای فرد تجویز شود مصرف منظم این داروها اهمیت زیادی دارد .

- کنترل خونریزی: مقدار کمی خونریزی پس از عمل طبیعی است خونریزی با حجم زیاد (بیش از قاعدگی نرمال) باید به پزشک گزارش شود.

- خودداری از فعالیت ها و ورزش های سنگین: تا یک هفته پس از هیستروسکوپی از انجام فعالیت های شدید و ورزش های سنگین خودداری کنید .

- کنترل درد: درد خفیف در شکم و یا لگن از پیامدهای رایج هیستروسکوپی است که اغلب به صورت خود به خود برطرف می شود و ممکن است پزشک برای تسکین آنها مسکن هایی نظیر پاراستامول، ایبوپروفن یا استامینوفن تجویز کند.



بیمار عزیز :

از پزشک خود زمان مناسب برای شروع مجدد مقاربت را بپرسید.

نمونه برداشته شده حین عمل جهت انجام آزمایشات پاتولوژیک به آزمایشگاه بیمارستان ارسال میگردد که باید جهت دریافت نتیجه یک هفته پس از عمل به آزمایشگاه بیمارستان مراجعه و جواب را دریافت نمایید و در اولین مراجعه به پزشک معالج نشان داده شود.



هیستروسکوپی

هیستروسکوپی روش تشخیصی است که طی آن لوله باریکی که دوربین کوچکی در سر آن تعبیه شده است از طریق واژن وارد رحم می شود ،

به این ترتیب پزشک داخل رحم را با تصاویر ارسالی از دوربین مشاهده می کند.

در مواردی مثل :خونریزی غیر طبیعی رحم ، سقط مکرر، یا نازایی با هیستروسکوپ داخل رحم بررسی می شود.

همچنین به کمک این روش می توان فیبرومهای داخل رحم ، پولیپ ها و چسبندگی ها و ناهنجاریهای مادرزادی مثل سپتوم رحمی برداشته شود.

- بهترین زمان انجام هیستروسکوپی بلافاصله پس از زمان اتمام قاعدگی است.

- ابتدا هیستروسکوپ از راه واژن داخل رحم می شود و حفره رحم با سرم استریل یا گاز دی اکسید کربن متسع می شود تا تمامی نواحی قابل ارزیابی باشد.

- پس از هیستروسکوپی ممکن است تا چند روز ترشحات واژینال، خونریزی مختصر و درد زیر دل وجود داشته باشد ، اما در صورت تهوع و استفراغ شدید، نفخ شکمی، خونریزی غیر طبیعی ، ترشحات بد بو ، دردشکم و مشکلات ادراری هر چه سریعتر به پزشک مراجعه فرمایید.